


غلال تونس



المجمع المشترك للقوارص والغلال



المجمع المشترك للقوارص والغلال

المجمع المشترك للقوارص والغلال هو مؤسسة ذات صيغة عمومية. يشرف عليها مجلس اداري متكون من ممثلين عن الدولة والفلاحين المنتجين للقوارص والغلال والمصدرين وأرباب الصناعات الذين يعالجون المنتوجات المذكورة.

الهدف: ان المجمع المشترك للقوارص والغلال مكلف تحت اشراف وزارة الفلاحة بالمهام التالية:

- جمع ودراسة ونشر كل المعلومات المتعلقة بانتاج وتحويل وتسويق القوارص والغلال الطرية.
 - تشجيع البحوث والتجارب والتوعية في مستوى الانتاج
 - البحث عن اسواق خارجية جديدة ومراقبة محطات التنضيد.
 - مراقبة الحالة الصحية للغراسات وتنظيم حملات مقاومة الحشرات الطفيلية وامراض الاشجار المثمرة والقيام عند الاقتضاء بالمداءات الضرورية مباشرة.
 - التصرف مباشرة في منابت معدة لانتاج مشاتل القوارص والاشجار المثمرة.
- ولتحقيق هاته الاهداف وضع المجمع التنظيم التالي:
- ادارة فنية مركزية ومصالح جهوية بولايات تونس ونابل والقيروان وصفاقس وسيدي بوزيد والمهدية
 - ادارة مكلفة بالمصالح التجارية
 - ادارة فرعية بمرسيليا (فرنسا)
 - مكتب للدراسات وللتوثيق.


المجمع المشترك للقوارص والغلال

شارع الحبيب ثامر عدد 12 ، تونس

الهاتف : 348.631 - 348.396

التلكس : 15082

أهم مناطق الانتاج



اللوز

المشمش

القوارص

الانتاج: 50.000 طن سنويا (بالقشور الجافة)

اهم الانواع: عشاق - فورنا - هش - زخاف - خوشي - مازطو - نوبراي - فخفاخ

اهم مناطق الانتاج: صفاقس - القيروان - سيدي بوزيد - المهديّة

رزمة التصدير: كامل السنة

خصائص الانواع: ان لتونس انواع عديدة من اللوز يصلح البعض منها للمائدة والبعض الآخر للتصنيع والحلويات ومن اهم خصائص اللوز التونسي طعمه اللذيذ وقيمته الغذائية الممتازة

الانتاج: 20.000 طن سنويا

اهم الانواع: عمر العش - كانينو

اهم مناطق الانتاج: القيروان - صفاقس - زغوان - قابس

رزمة التصدير: ماي وجوان

خصائص المشمش التونسي:

عمر العش: هو نوع بدري (15-20 ماي) متوسط الحجم

حسن المظهر وملون بالاحمر. وهو معطر ولذيذ جدا.

نواته غير ملتصقة

كانينو: هو نوع فصلي (اواخر ماي واول جوان)

حجم كبير، حسن اللون والطعم

الانتاج: 250.000 طن سنويا

اهم الانواع: برتقال مالطي - كليمنتين - مادليّة - ليمون

اهم مناطق الانتاج: نابل - تونس - بنزرت

رزمة تصدير البرتقال المالطي: ابتداء من نصف ديسمبر

الى موفى افريل

خصائص البرتقال المالطي:

■ شكل كروي او بيضوي

■ معدل الوزن: 140 غرام

■ سهل التقشير وملون

■ بدون بزور غالبا

■ عصيره غزير ولذيذ



الاعمال الفلاحية :

- أسقى بانتظام بكميات قليلة من الماء تزايد تدريجيا
- حمر تحت الاشجار
- جنى الفلانسيا والقارص

المداوات :

- راقب وجود الزيلى وبادر بمقاومته حين ظهوره حتى لا ينتشر وذلك باستعمال احدى المواد التالية (بعد انتهاء الزهر)

- ديميتوات % 40 : 80 صم مكعب من المادة التجارية فى المائة ليتر ماء

(Diméthoate)

- فوسفاميدون % 50 : 60 صم مكعب من المادة التجارية فى 100 ليتر ماء (Dimecron 50)

- اوكسى ديماتون % 25 : 100 صم مكعب من المادة التجارية فى مائة ليتر ماء (Metasystox)
- لا تستعمل هذه المواد وقت الزهر .

الاعمال الفلاحية :

- واصل بانتظام سقى الاشجار ولو فى الليل (ثلاثة مرات فى الشهر) واذا تعذر ذلك يمكن استعمال طريقة رى بالتداول (نصف حوض كل اسبوع او عشرة ايام)

المداوات :

- واصل مداواة حشرات الكوشنى (انظر فبفرى)
- استعمال المواد الكيماوية لمقاومة النجم والسعد



الاعمال الفلاحية :

- واصل السقى بانتظام (مرتين فى الشهر أو ثلاثة)
- واصل جنى القوارص (فلانسيا - قارص)
- أفرش الامونيتير % 33 بمقدار 750 غرام لكل شجرة فى اواخر الشهر

المداوات :

- واصل مداواة الزيلى
- أشرع فى مداواة الكوشنى (انظر سبتمبر) مع تجنب استعمال الاوليوباراتيون فى فترة الصيف .

الاعمال الفلاحية :

- اذبر شجر الليمون بعد جمع الغلة
- واصل بانتظام سقى الاشجار (ثلاثة مرات فى الشهر)
- أحضر الاسمدة (فسفاط - بوطاس - امونيتير)
- أحضر الارض للغراسات الجديدة (مقاومة النجم)

المداوات :

- واصل مداواة الكوشنى (انظر جوان وسبتمبر)
- احضر الآلات لمداوات الذبابة (سيراتيت)
- استعمال المواد الكيماوية لمقاومة النجم والسعد

رسمية

الاعمال الفلاحية

فى غراسات القوارص

الادارة الجهوية للقوارص بمنزل بوزلفة

الهاتف : (02 92 076)

سبتمبر

الاعمال الفلاحية :

- أفرش الاسمدة المعدنية حسب الكميات الآتية :
750 غرام امونيتير % 33 مع 750 غرام فسفاط % 45 مع كيلو بوطاس % 50 لكل شجرة

- أفرش الاسمدة الحيوانية (الغبار) بمقدار عشرة اطنان

فى الهكتار

- أسقى وحمر تحت الاشجار مرتين فى الشهر

- أزبر شجر الليمون بعد جمع الغلة

المداوات :

- داوى ضد الكوشنى التى تسبب فى ظهور السويدية « فيماجين » (انظر فيفرى)
- داوى الاشجار ضد السيراتيت وذلك باستعمال احدى

المواد التجارية التالية

- ديميتوات % 40 : 0,100 ليتر مع 0,300 ليتر من اليزاتكس والمجموع فى 100 ليتر ماء (لا يستعمل على الليمون والليم والارنج).

- فانتيون % 50 : 0,100 ليتر من المادة التجارية و 300 0 ليتر من اليزاتكس فى 100 ليتر ماء، وتكون هاته العملية برش الناحية الجنوبية للشجرة ورش كل

الطواى والاحواض وذلك مرة كل اسبوع

أكتوبر

الاعمال الفلاحية :

- ازرع الغبار الاخضر (فول مصرى او غيره)
- اسقى القوارص اذا كان الحريف جافا (مرة او مرتين)
- واصل فرش الغبار الحيوانى
- افرش الاسمدة المعدنية اذا لم يقع ذلك فى سبتمبر
- اجمع غلة الحريف (هندى) التى تاوى الذبابة وابعدها

الغلة المتضررة

- اقتناء ادوات الجنى (مقصات - سلايم - اكياس)

المداوات :

- اوقف عمليات مداواة الكوشنى
- واصل المداوات ضد الذبابة (سيراتيت - انظر سبتمبر)
- اشروع فى المداوات ضد عنكبوت البراعم فى شجر الليمون باستعمال مسحوق البخارة بمقدار 400 غرام فى مائة ليتر ماء.

نوفمبر

- واصل مداواة السيراتيت اذا اقتضى الحال ذلك
- احصر الارض للغراسات الجديدة
- جنى الكليمانتين والنافال والليمون مع مراعات قواعد الجنى واستعمال الآلات اللازمة.

ديسمبر

- اتصل بالمنبت لتقديم حاجياتك من المشاتل

- اتمم جنى الكليمنتين

جانفى

الاعمال الفلاحية :

- جنى البرتقال المائى والنافال والمادلينة والليمون
- بعض نصائح جنى القوارص :
- تقليم الاطافر
- تجنب الارتقاء فوق الاشجار (يجب استعمال سلم او صرافة)
- استعمال مقص الجنى وكيس الجنى
- استعمال صناديق البلاستيك او خشب اماس
- تجنب اسقاط الثمار على الارض
- الرفق عند نقل الصناديق حتى لا تتضرر الثمرة

مارس

الاعمال الفلاحية :

- أفرش الامونيتير % 33 اذا لم يتم ذلك فى الشهر الفارط
- واصل غراسه الاشجار الجديدة
- واصل زبر الاشجار التى تم جنيها (المائى)
- تفقد الابار ومضخات الماء والسواقي
- توقيف الزبر عند الأزهار

المداوات :

- مقاومة عنكبوت البراعم على الليمون (انظر اكتوبر)
- واصل المداواة ضد الكوشنى (فيفرى)
- توقيف المداواة قبل الازهار

أفريل

الاعمال الفلاحية :

- جنى زهر الارنج
- اتمم عملية الزبر قبل ظهور الزهر
- حوض الاشجار (حوض داخلى وحوض خارجى)
- أسقى اذا كانت الامطار قليلة
- رش الحامض الجبيرلىنى على زهر الكليمانتين (قرص فى مائة ليتر ماء) بواسطة آلة متوسطة الضغط

فيفرى

- ازبر الاشجار التى تم جنيها (كليمانتين ونافال)
- افرش الامونيتير % 33 بمقدار 1,500 كيلو للشجرة الواحدة وادفنه بحرث خفيف وكذلك الفول (غبار اخضر)
- اشروع فى غرس الاشجار الجديدة
- واصل جنى الثمار (المائى)

مداواة الكوشنى :

- داوى هذه الحشرة باستعمال آلة قوية الضغط واحدى المواد الآتية :
- ايلتراسيد % 40 : بمقدار 150 صم فى 100 ليتر ماء
- اوليوباراتيون % 3 : بمقدار ليتر ونصف فى 100 ليتر ماء،

المجمع المشترك للقوارص والغلال

4، نهج كلوفيس - تونس -

الهاتف : 348.396 / 348.631



زبر

اشجار القوارص

- يمكننا أن نعرف أن الزبر تم بطريقة مرضية اذا كان نتيجه
بعث أعراف لها قوة متوسطة بينما اذا ظهر عدد كبير من
الأبغال فيكون ذلك نتيجة قص عنيف .

- يكون القص عنيفا اذا كانت الشجرة ضعيفة في عمومها
ويكون ضعيفا في عكس ذلك ، لذا يكون القص عنيفا قبل
صابة كبيرة وليس بعدها .


- للقوارص التي تضع كثيرا من الأبغال ، يجب أن تكون
مراقبتها متكررة وخاصة في صغرها وذلك لقص كل الأغصان
المضرة وتقويس بعض الأبغال لتضعيفها (الكليمانتين
والمندرين والويلكينغ) .

- يجب قص الغصن أو العرف من مكان انطلاقه وحرق
كل أدوات الزبر بعد مرورها على شجرة مريضة أو مسحها
بالجافال ، حتى يقع تلافى انتشار الامراض الفيروزية .

الزبر على شكل الطابية

تصلح هذه العملية بالنسبة للفراسات الضيقة التي تشابكت
أغصانها .

تقوم بهاته العملية في الشتاء وبعد جني الثمار وذلك بالتنقيص
من طول الاغصان المتصلة ببعضها بين صفى أشجار شمالا
وجنوبا وذلك لتكوين ممر بين صفى أشجار عرضه قرابة المتر
ونصف المتر (5)



زبر الانتاج

يصلح المقص بعد التغيير والرى والمداواة وخدمة الأرض
ضعف الشجرة لكنه يبقى غير قادر أمام قوتها . ذلك أنه
يكون القص هاما في حملته اذا كان انتاج الأغصان ضعيفا
ويهم الأغصان الأكثر قوة من غيرها لتقوية الأجزاء الضعيفة .

- من أخاصيص القوارص انها تضع قرب رؤوس الأغصان
وأماكن القص عددا كبيرا من الأعراف التي يجب التخفيف
منها والملاحظ أنها تحمل غلالها على أغصان السنة نفسها .

- من الواجب أن يقع تحضير أغصان جديدة لتعويض النهرمة
وذلك في أسفل الأغصان التي تظهر ضعفا منذ سنوات من
قبل .

- كل غصن عمودي يظهر قوة نادرة هو « بغل » فاذا لم يكن
في موقع سد فراغ يجب حذفه في أقرب وقت بينما يحتفظ
به على عكس ذلك مع تحبيسه قبل موقع الفراغ أو تقويسه
بالنسبة للكليمانتين .

- للقوارص خاصية وضع الكثير من الأغصان خاصة منها
(المندرين والويلكينغ والكليمانتين والتارص) لذا يقع الزبر
بطريقة التخفيف عوض القص الجزئي .

- يقع تغطية كل مكان قص كبير بمادة تحميه من الجفاف
والتعفن (كالماستيك أو الفلينتكوت أو الكنكروتوكس أو غيرها)

كيفية الزبر

بعد مماناة الشجرة وذلك في الشتاء بالنسبة للبرتقال
وفي الصيف للقارص ، يضع الزبار مخططا للعمل :


- يفحص في أول الأمر قوة أغصان السنة نفسها (الزيادة)
التي تقله على درجة قوة القص الذي سيقوم به .

- يجب تلافى احداث فراغ كبير وخاصة اذا كان احتمال
سده غير ممكن في أقرب الآجال .

- بعد القص الكبير نبدأ التخفيف في الأغصان الباقية
(الأعراف الميتة والمريضة والمتحاذكة وتخفيف الباكورات) .

الزبر التكويني

الهدف منه هو الحصول على جذع قصير لا يفوق 80 سم وعدد محدود من الأعتاق (3 أو 4) وشكل مكور للشجرة . عند الغراسه يجب السهر على أن يكون مكان التلقيم فوق سطح الأرض بـ 30 سم على الأقل حتى نتفادى ظهور





- خلال السنة التي تلى الغراسه تضع الفوارص عددا كبيرا من الأغصان فلا يقع حذفها وذلك لتقوية العروق بل يقع تحبيس البعض منها الغير مرغوب فيه على مراحل وذلك بعد اختبار أولى لأعتاق الشجرة التي يجب أن لا تكون ظاهرة من نفس المكان أو في نفس الاتجاه ويقع فطم الغصن الرئيسي في مستوى المعته العليا التي وقع اختيارها (1)

- خلال السنة الثانية التي تلى الغراسه يقع اختيار غصنين أو ثلاثة على كل من الثلاثة أو أربعة أعتاق التي وقع تكوينها في السنة الماضية ، بينما يقع تحبيس الآخرين وحذفهم على مراحل خلال مدة راحة الشجرة .

وفي السنوات الموالية لا ينبغي تحبيس هذه الأغصان التي اخترناها ويجب تمكينها من الامتداد طولا (2) .

ملاحظة هامة :

يجب القيام في السنين الأولى بعمليات تحبيس متكررة طوال السنة قبل حذف الأغصان الغير صالحة لأن عدم التحبيس يمكن الأغصان الغير صالحة من النمو على حساب الأغصان التي سيحتفظ بها ، كذلك لا ينبغي تحبيس الأغصان الغير مرغوب فيها مرة واحدة لأن ذلك يعطل تغذية الشجرة ويؤخر نموها (4) .



عندما تبلغ الثلاثة أو أربعة أغصان الرئيسية 60 أو 80 سم يمكن تحبيسها وكذلك الأغصان الثانوية لتمكينها من بعث أغصان جديدة ولا يقع حذف أغصان أخرى إلا الأبال التي تنبعث من الأعتاق عموديا ولا ينبغي تركها تمتد كثيرا قبل حذفها حتى لا تضعف الشجرة ويجب السهر على تكوين الأغصان الثانوية موزعة توزيعا متلائما (3) .



أفريل

- واصل عملية مداواة الفقاعيات خاصة اذا كان الربيع ممطرا (خاصة بالنسبة للخواخ)
- اتمم فرش الكمية الثانية من الامونيتر
- واصل عملية المداواة ضد الزيبي بالنسبة للوز والخواخ
- اشرع فى جنى اللوز الطرى والمشمش البدرى
- واصل السقى بالنسبة للمشمش والخواخ
- اشرع فى عملية تخفيف غلة الخوخ

جوان

- واصل حتى اللوز الطرى والمشمش
- اشرع فى جنى الخوخ مع احترام القواعد الفنية
- واصل مقاومة الذبابة فى غراسات الخوخ
- واصل السقى بعد الجنى
- اشرع فى تحبيس الاغصان الغير صالحة بالنسبة للخواخ (Taille en vert)
- واصل مقاومة النجم

جويلية

- اتمم جنى المشمش
- واصل جنى الخوخ واللوز
- واصل مقاومة الذبابة
- واصل السقى
- واصل عملية التحبيس (Taille en vert)
- واصل مقاومة النجم
- اذا كانت كميات الماء غير كافية يمكن استعمال طريقة الرى بالتداول

ماي

- توقف عن مداواة الفقاعيات
- واصل مداواة الزيبي بالنسبة للوز والخواخ
- اشرع فى مقاومة ذباب الغلال (Cératite)
- بالنسبة للخواخ حسب الطريقة التالية :

- قم برش الحوض تحت الشجرة كل اسبوع بخليط يحتوى على 100 صم من الديميتوات مع ليتر ليزاتكس فى مائة ليتر ماء. ويقع الرش بعد فرش الحوض بالتبن او الاعشاب ولا ينبغى رش هذا الخليط على الثمار
- اشرع فى جنى اللوز الطرى والمشمش البدرى. مع مراعات قواعد الجنى خاصة بالنسبة للمشمش
- واصل السقى بالنسبة للخواخ اما بالنسبة للمشمش فيجب التوقف اسبوعا على الاقل قبل بدء الجنى
- اشرع فى مقاومة النجم فى غراسات اللوز خاصة

أوت

- واصل جنى اللوز الجاف واتمم جنى الخوخ
- واصل عملية تحبيس الخوخ
- واصل السقى بالنسبة للمشمش والخواخ
- واصل مقاومة النجم

المجمع المشترك للقوارص والغلال

12، شارع الحبيب نامر - تونس -
الهاتف : 348.396 - 348.631



رزنامة

الاعمال الفلاحية

فى غراسات المشمش والخواخ

واللوز

الادارة الجهوية لاشجار النوى بالقيروان
الهاتف : (07.21 104)

سبتمبر

1 - في الغراسات السقوية :

- افرش الاسمدة العضوية (الغبار) بمقدار يتراوح من خمسة الى عشرة اطنان في الهكتار :
- **فرش الاسمدة المعدنية حسب الكميات التالية :**
- بوطاس % 50 : كيلو واحد لكل شجرة منتجة.
- فسفاط % 45 : 750 غرام لكل شجرة منتجة.
- ويجب دفن هذه الاسمدة وكذلك الغبار بحراثة وسقى الاشجار اذا لم تكن امطار الحريف كافية.
- ب - اما بالنسبة للغراسات البعلية يمكن الاقتصاد على نصف هذه الكميات.

أكتوبر

- واصل فرش الاسمدة والغبار اذا لم يتم ذلك في سبتمبر.
- اشرع في **زبر اللوز** (ابتداء بالانواع البدرية) .
- توقف عن السقى بعد فرش لاسمدة .

نوفمبر

- اتمم فرش الاسمدة والغبار
- اشرع في **غرس اللوز** الجديد
- واصل زبر اللوز
- اشرع في زبر المشمش (ابتداء بالانواع البدرية)
- اشرع بعد الزبر في **المداواة الشتائية** باستعمال خليط الدواء التالي :
- اوليوباراتيون % 3 : 1.5 ليتر في مائة ليتر ماء
- اكسيكلوروبر النحاس % 50 : 500 غرام في مائة ليتر ماء
- بالنسبة للوز
- وكيلو واحد في مائة ليتر ماء بالنسبة للمشمش والحوخ
- وهذه المداواة تمكن من التخفيف من حدة امراض الربيع
- (كالزيل والونيليوز والكلكوك)

ديسمبر

- واصل الغرس الجديد
- واصل زبر شجر اللوز والمشمش
- اشرع في زبر الحوخ (ابتداء بالانواع البدرية)
- وصل المداواة الشتائية بعد عملية الزبر
- افرش **الامونيتير** % 33 في الشهر الذي يسبق الازهار حسب المقدار التالي :
- 400 غرام لكل شجرة بعلية
- 750 غرام لكل شجرة مسقية.

جانفي

- اتمم زبر اللوز والمشمش
- واصل زبر الحوخ
- توقف عن المداواة الشتائية بالنسبة للوز وانواع المشمش البدرية 15 يوما قبل بزوغ البراعم (Débourrement)
- اشرع في عملية **المداواة الاولى ضد الفقاعيات عند بزوغ** (Stade débourement) البراعم باحدى المواد التالية :
- التيرام (Thirame) % 80 : 300 غرام في مائة ليتر ماء
- البنلاط (Benlate) % 50 : 80 غرام في مائة ليتر ماء
- التيوفانات (Pelt 44) % 70 : 100 غرام في مائة ليتر ماء
- المنكوزاب (Mancozèbe) % 80 : 200 غرام في مائة ليتر ماء
- واصل فرش الامونيتير قبل الازهار
- اتمم غرس اللوز والمشمش البدرى
- واصل غرس الحوخ

فيفري

- واصل فرش الامونيتير بالنسبة للانواع التي لم تزهر وتوقف عن ذلك بالنسبة للتي ازهرت.
- واصل المداواة الاولى ضد الفقاعيات وتوقف عند ظهور الزهر.
- اتمم غرس المشمش والحوخ

مارس

- اشرع في المداواة الثانية ضد الفقاعيات بعد عقد الثمرة وقم بعملية ثالثة اذا كان الربيع ممطرا
- اشرع في فرش كمية ثانية من **الامونيتير** تعادل الكمية الاولى 15 يوما بعد تمام عقد الثمرة
- اشرع في السقى اذا كان الربيع جافا
- اشرع في مداواة **الوز ضد الزيلي** (Pucerons) باستعمال احدى المواد التالية :
- ديميثوات (Diméthoate) % 40 : 100 صم في مائة ليتر ماء
- فسفاميلون (Dimecron 50) 60 صم في مائة ليتر ماء
- ميتاسيستوكس (Metasystox) 100 صم في مائة ليتر ماء
- وينبغي المبادرة بمقاومة الزيلي حين اول ظهوره حتى لا ينتشر في كامل الضيعة

المجمع المشترك للقوارص والغلال

4، نهج كلوفيس - تونس -

الهاتف : 348.396 / 348.631



زبر
اشجار النوى

توصيات عامة

- عند القيام بعملية زبر يجب تلافي احداث فراغ كبير وخاصة اذا كان احتمال سده غير ممكن في اقرب الآجال.
- يكون القص عنيفا اذا كانت الشجرة ضعيفة في عمومها ويكون ضعيفا في عكس ذلك. لذا يكون القص عنيفا قبل صابة كبيرة وليس بعدها.
- يجب حرق كل ادوات الزبر بعد مرورها على شجرة مريضة.
- يجب تجنب القيام بعملية الزبر عند نزول المطر وفي الصباح الباكر.
- تقم تقطية كل مكان قص كبير بمادة تحميه من الجفاف والتعفن (كالماستيك او الفلينتكوت).
- بعد عملية الزبر تقوم بالمداوات الشتائية بواسطة المواد النحاسية وذلك للوقاية ضد الطفيليات وسد اماكن القص لحمايتها من التعفن.


ونظرا لهاته المعطيات فان الاغصان لها ميل الى النمو طولاً وللحيلولة دون تجرد اسفل الشجرة يجب زبر الاغصان الآتية على عيينين وذلك لتعويضها بغيرها ونقوم بالزبر حسب الترتيب التالي :

- الاغصان التي اثمرت سابقا
- الاغصان المتحاكمة التي عمرها سنة واحدة
- التخفيف من اغصان السنة نفسها حتى لا يتكاثر الغلة فيضعف حجمها (9)



عملية التحسيس في الصيف

تمهيدا لعملية الزبر في الشتاء تقوم بعملية تحسيس في الصيف في شهر جوان بالنسبة للاغصان الغير مثمرة وفي أوت وسبتمبر بالنسبة للاغصان التي جمعت غلتها. ويجب الاحتفاظ بالاغصان التي عمرها أقل من سنة (الا اذا تكاثرت).





الزبر التكويني

الغاية منه هو الحصول على جذع قصير (50 سم) به 3 أو 4 أعتاق متوازنة وموزعة توزيعاً مناسباً وإعطاء الشجرة شكلاً مكوراً :


السنة الأولى :

عند انغراسه يقع قص الشجرة على علو 50 سم وإزالة الأغصان الفرعية على عيين (1)



السنة الثانية :

خلال السنة يقع اختيار 3 أو 4 أغصان قوية بعيدة نسبياً على بعضها ومتجهة في شكل مكور حول جذع الشجرة ليتكون منها هيكل الشجرة وأما الأغصان الأخرى فيقع تحبيسها في الصيف لأن حذفها النهائي يضعف الشجرة (2)




السنة الثالثة :

في الشتاء يقع تنظيف الجباد على طول 40 إلى 50 سم بالنسبة للمشمش والعوينة والجوخ (اللوذ على طول 20 سم) حذف الإفغال على أصلها

في شهر جوان وجوبلية :

تحبيس الأغصان الغير صالحة في الصيف لحذفها على أصلها في الشتاء الموالي مع الاحتفاظ بغصنين على كل عتقة لتكوين الهيكل الثانوي (4)



السنة الرابعة :

يقع الاحتفاظ بعقتين على كل عتقة ثانوية وذلك لتكوين الهيكل الاعلى للشجرة. كما يقع تحبيس الأغصان الغير مرغوب فيها في الصيف لحذفها على أصلها في الشتاء الموالي وتنحصر عمليات التكوين من نهاية السنة الرابعة في المراقبة وزبر الانتاج (5)

زبر الانتاج


يقام بهاته العملية سنوياً من شهر نوفمبر الى موفى ديسمبر وذلك لتنظيم الانتاج والمحافظة على توازن الشجرة وسلامتها وذلك حتى يدخل النور والهواء الى كامل الشجرة.

طريقة الزبر :

– بالنسبة للوز والمشمش والعوينة : تقوم بعملية الزبر على النحو التالي :


حذف الإفغال – إزالة الأغصان المتحاككة او التي تضايق غيرها – تنظيف رأس الجباد على طول 40 إلى 50 سم مع عدم تحبيسها.

أما الأغصان الصغيرة انتى تظهر على الاعتاق فهي الأغصان المشمرة التي يجب الاحتفاظ بها مع زبرها على النحو التالي :



– أغصان السنة الأولى يقع تحبيسها على عيين أو عيينين من عيون الزهر (ب) أما اذا كانت طويلة وفارغة في أسفلها فيستوجب حذفها تماماً (ج). أغصان الخطب يقع تحبيسها على 3 أو 4 عيون (د) قطة ماى يجب الاحتفاظ بها مع الملاحظة انه اذا كانت موجودة بين غصنين يقع حذف احدهما (هـ) (6)

– بالنسبة للجوخ : للجوخ أخصية تميزه على اشجار النوى الأخرى المذكورة. وهو انه يزهر الأغصان الحاملة في نفس الوقت لعيون الزهر وعيون الخطب والتي عمرها سنة واحدة ، حيث ان الفصن الذي يزهر مرة لا يزهر ثانية. (8 و 7)



الزبر على عيينين

8

عمر أقل من سنة | عمر سنة | عمر سنتين

المجمع المشترك للقوارص والغلال

4، نهج كلوفيس - تونس -

الهاتف : 348.396 / 348.631



زهر

اشجار البذرة

هـ) يقع قص العرف على ثلاثة عيون ظاهرة . فتعطينا بعد ذلك العين أو العينين العليا أعراف للحطب والسفلى شوكة ، أما إذا كان ضعيفا فيقع تحبيسه على عيينين فقط .

و) بعد القيام بالعملية هـ) تصبح في السنة المقبلة « شوكتين وعرف للحطب » يقع تحبيس عرف الحطب على عين ظاهرة إذا كانت الشجرة ضعيفة أما إذا كانت قوية فيقع تحبيسه على عيينين أو ثلاثة .

ز) بعد القيام بالعملية هـ) قد تعطينا في السنة المقبلة « شوكة وعرف حطب » يقع حذف العرف الأعلى في مستوى العرف الثاني الذي يقع تحبيسه على عيينين ظاهرتين فنلاحظ بعد ذلك أن « الشوكة » تصبح عين زهر والعين السفلى للعرف « شوكة » و « العين الثانية » عرف حطب

ج) يحمل الفصن المثمر عرف حطب و3 شوكات يقع تحبيس الفصن في مستوى الشوكة الثالثة .

ط) تحمل الخميطة : شوكة وعين زهر وهرف ، يقع حذف العرف في مستوى عين الزهر .


ي) تحمل الخميطة : شوكة وعلمة عيون زهر وعرف : يقع تحبيسها في مستوى عين الزهر السفلى ، أما إذا كان إنتاج الشجرة لعيون الزهر ضعيفا في عمومها فيقع التحبيس على عين الزهر الثانية عوضا عن الأولى .

ك) تحبيس عرف الحطب الذي قمنا به في السنة الماضية على ثلاثة عيون قد يعطينا ثلاثة أعراف حطب هاته السنة فيقع حذف اثنين والاحتفاظ بالضعيف منهم مع تحبيسه على ثلاثة عيون ومع مراعاة قربه من الأصل .

ل) بعد زهر الخميطة في السنة الماضية ، أعطتنا هاته السنة ثلاثة أعراف ، فيقع حذف الأبعد عن الأم وتحبيس الثاني على عيينان والثالث على عين .

م) يحمل الفصن عريين وشوكة . ويقع تحبيس كل من العريين على عين والاحتفاظ بالشوكة .

ن) بعد حذف الخميطة على أصلها قد يظهر مكانها عدة أعراف حطب غير منتجة فيقع حذفهم مع الاحتفاظ بواحد فقط (الضعيف منهم) .



كيفية زهر الغمائل المثمرة

أ) إذا كانت تحمل عيينين للزهر لا يقع مسها . أما إذا كانت أكثر فيقع تحبيسها على عيينين .


ب) يجب الاحتفاظ بالكيسين مع تقصيرهما فقط

ج) تقصير الكيس والاحتفاظ بالعرف إذا كان قصيرا ويقع تحبيسه على عيينين إذا فات 25 صم .


الزبر التكويني

- السنة الأولى :

عند الفراسة (نوفمبر ديسمبر)
يقع تحبيس الشجرة على علو
70 الى 90 سم (1) .




في شهر جوان أو جويلية يقع
تحبيس الأغصان الغير الصالحة
بعد اختيار الثلاثة أو الأربعة
أغصان التي سيحتفظ بها
كاعتاق للشجرة ولا يجب أن
تكون ظاهرة من نفس المكان
أو في نفس الاتجاه . (2) .



- السنة الثانية :

في بداية السنة الثانية
(ديسمبر جانفي) يقع حذف
الأغصان التي وقع تحبيسها
سابقا ويقع الاحتفاظ بالثلاثة
أو الأربعة أغصان الأخرى
كاملة الا اذا فاتت 60 سم
فيقع تحبيسها على 50 أو 60
سم (3) .



في شهر جوان أو جويلية يقع
تحبيس الأغصان الغير صالحة
الموجودة على الاعتاق ويحتفظ
بفصنين أو ثلاثة على كل عنقة




السنة الثالثة

في الشتاء (ديسمبر - جانفي)
تحذف الأغصان التي وقع
تحبيسها في الصيف ويحافظ
على الأغصان الأخرى كاملة (5)



هيئة الشجرة بعد اتمام تكوينها

تتكون من جذع واحد ، 3 أعتاق رئيسية 6 أعتاق ثانوية و 12
غصن رئيسي (6) .



زبر الانتاج

تزهر أشجار البذرة على الأغصان التي عمرها يزيد على
عامين بشرط أن تقع على أعتاق متوسطة القوة وأن يصلها
الضوء والهواء .

تقوم بعملية زبر الانتاج في الشتاء (ديسمبر الى فيفري)
يجب أن تسهر على أن تنمو الأغصان الرئيسية حرة . في
أسفل الأغصان التي عمرها سنتين تظهر براعم صغيرة مذبذبة
تسمى « شوكة » يجب الاحتفاظ بها اذا هي تعطي الأغصان
المثمرة . ويجب دائما مراعاة تقريب الثمار من الاعتاق أكثر
ما يمكن .

يقع حذف الأبال وتخفيف الأغصان الصغيرة المتحاكة
ويقع تحبيسها على عين أو عيتين اذا كانت ضعيفة .

يجب أن تكون عملية الزبر متماشية مع قوة الشجرة حتى لا
تتسبب في ظهور أغصان الحطب بكثرة : فالشجرة القوية
يكون زبرها خفيفا والشجرة الضعيفة يكون زبرها شديدا .

مختلف أجزاء الأغصان

- الخيملة (coursone) هي تظهر على الاعتاق والأغصان

الرئيسية وتحمل غصينات الزهر أو الحطب أو النوعين
معا ، وتتركب مما يلي :

- الكيس (bourse) هو مكان ظهور ثمار السنة الماضية
وهو يحمل عادة عيونا للزهر (ب) .

- العريف (brindille) هو عرف رقيق به عيون للحطب
وعيون للزهر (ي) .

- العرف المثمر (lambourde) يكون حاملا لعين تزهر
في آخره (أ) .

- عرف الحطب (rameaux à bois) عرف لا يحمل الا
عيونا للحطب ويكون عمره عادة سنة واحدة (ي - ن)

- الشوكة (dard) هو برعم صغيرة ومذبذب يعطي عيونا
للزهر ويظهر في أسفل أعراف الحطب بعد عام ، أو الأغصان
المسنة (ح - و) .

انواع الاشجار المثمرة الملائمة للمناطق الطبيعية الكبرى في البلاد التونسية

(حسب الوثيقة عدد 83 لمعهد البحوث الفلاحية بتونس)

المناطق الإجاص	الاوربية الشمالية	المرتفعات العليا	المناطق الحارة	السواحل الشمالية	السواحل الوسطى	السواحل الجنوبية	السباسب السفلى	السباسب العليا
<u>القوارص</u>	كليمنتين وشنطن نافال فلنسيا زنباع مارش	/	كليمنتين مالطى ولكنج زنباع مارش ليمون أريكا	كليمنتين مالطى وشنطن نفل ولكنج فلنسيا زنباع مارش ليمون أريكا	كليمنتين مالطى وشنطن نافال ولكنج فلنسيا زنباع مارش ليمون أريكا	كليمنتين مالطى ليمون أريكا زنباع مارش	/	/
<u>المشمش</u>	وردى صايب كانينوس زين أمل	قصرين 2 قصرين 3	باكور فوراتي عمر العش	وردى صايب كانينوس زين أمل	باكور وردى صايب فوراتي عمر العش أمل زين	باكور فوراتي عمر العش	باكور وردى صايب عمر العش كانينوس زين أمل	/
<u>اللووز</u>	هش بن اسماعيل خوخى بلانكو روندفين ماركونا فرنيس فورا التكساس نك + الترا برلاس فردويل	مازطو فرنيس تكساس نك + الترا فردويل	بلانكو هش بن اسماعيل خوخى عشاق قسنطيني	بلانكو هش بن اسماعيل خوخى روندفين ماركونا برلاس	قسنطيني عشاق ماركونا روندفين	قسنطيني عشاق زحاف ماركونا	قسنطيني عشاق مازطو نك + الترا برلاس فورا ماركونا	مازطو فرنيس تكساس انك + الترا فردويل برلاس فورا
<u>الخوخ</u>	اسبر نكتايم اسبر نكراست كوروني ردطوب سيوانى ساوتلاند ج. ه. هال أرلى ألبرطا ماي قولد	اسبر نكراست ماي قولد كوروني ردطوب سيوانى ساوتلاند ج. ه. هال أرلى ألبرطا	344-15 352-6 318-12 اسبر نكراست ماي قولد كوروني ردطوب سيوانى ساوتلاند ج. ه. هال أرلى ألبرطا	344-15 352-6 318-12 ماي قولد	344-15 352-6 318-12 ماي قولد	318-12 ماي قولد	اسبر نكتايم اسبر نكراست 318-12 ماي قولد كوروني ردطوب سيوانى ساوتلاند	/
<u>الإجاص</u>	جول قيو ويلدار ويليامز باخامس ترينف باس كراسان	جول قيو ويلدار باخامس ترينف باس كراسان	/	مسكى احرش مسكى بوقدمة ويلدار	مسكى احرش مسكى بوقدمة	مسكى احرش مسكى بوقدمة	/	/
<u>التفاح</u>	قولدن ريشارد ستار كريمن	قولدن ريشارد ستار كريمن	/	بوطبقاية زينه عزيزة شهلة	بوطبقاية زينه عزيزة شهلة	بوطبقاية زينه عزيزة شهلة	/	/
<u>العوينة</u>	متلاي بيوتى سنطاروزا كلساي سكر اوتليتتى سطناني كلساي	سكر اوتليتتى سطناني كلساي	/	قولدن يابان كلساي سكر اوتليتتى سطناني	قولدن يابان متلاي بيوتى سنطاروزا	/	متلاي بيوتى قولدن يابان كلساي سنطاروزا	/
<u>حب اللووك</u>	بوعرقوب بورلات مورو نابليون	بوعرقوب بورلات مورو نابليون	/	بوعرقوب	بوعرقوب	/	/	/
<u>تحديد المناطق تقريبا</u>	جندوبة بوسالم غار الدماء باجة مجاز الباب زغوان	تبرسق الكاف سليانة مكشر تالة سبيبة	الحمامات المنستير المكنين المهدية جربة قرقنة	طبرقة بنزرت تونس الوطن القبلي	النفيضة سوسة السيخة الجم الخنشة صفاقس	محرس مارث قابس جرجيس	القيروان سيدي بوزيد المكناسي السواهي جلمة حاجب العيون	سبيطالة القصرين فريانة قفصة